

LIPACTIN® GEL

Heparine-natrium 175 I.U.

Zinksulfaat 5 mg

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u LIPACTIN® GEL zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 10 dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.



In deze bijsluiter:

1. Wat is LIPACTIN® GEL en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u LIPACTIN® GEL gebruikt?
3. Hoe wordt LIPACTIN® GEL gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u LIPACTIN® GEL?
6. Aanvullende informatie.

1. Wat is LIPACTIN® GEL en waarvoor wordt het gebruikt?

Gel voor lokaal, uitwendig gebruik.

Antivirale gel voor gebruik op de huid. Te gebruiken bij de behandeling van koortsblaasjes.

2. Wat moet u weten voordat u LIPACTIN® GEL gebruikt?

Gebruik LIPACTIN® GEL niet ...

- Als u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van LIPACTIN® GEL.
- Bij ernstige immunosuppressie (vb. AIDS of beenmergtransplantatie).
- Bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Wees extra voorzichtig met LIPACTIN® GEL ...

- Want LIPACTIN® GEL is enkel bestemd voor uitwendig gebruik.
- Want contact met de ogen moet vermeden worden.
- Want bij het optreden van overgevoeligheidsreacties dient de behandeling onmiddellijk gestopt te worden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt of onlangs heeft gebruikt, ook als het geneesmiddelen betreft, waarvoor geen voorschrift noodzakelijk is.

Gebruik van LIPACTIN® GEL met voedsel en drank

Geen interacties gekend.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

LIPACTIN® GEL gedurende de zwangerschap en borstvoeding alleen gebruiken in overleg met uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Geen bijzondere voorzorgen nodig.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van LIPACTIN® GEL

Niet van toepassing.

3. Hoe wordt LIPACTIN® GEL gebruikt?

Volg deze instructies nauwgezet op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Bij de eerste tekenen van een infectie (jeuk, trekkerig gevoel, pijn, blaasjesvorming) LIPACTIN® GEL 3 tot 6 keer per dag in een dun laagje op de aangetaste huid en lippen aanbrengen.

- Na het verdwijnen van de symptomen wordt de behandeling best nog enkele dagen voortgezet.
- LIPACTIN® GEL mag niet gebruikt worden bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Uitwendig gebruik.

Wat moet u doen als u meer van LIPACTIN® GEL heeft gebruikt dan u zou mogen

Bij lokaal, uitwendig gebruik in de aangegeven hoeveelheid is er geen gevaar voor overdosering. Indien de gel per ongeluk of door onvoorzichtigheid werd ingenomen, raadpleeg uw arts, apotheker of het Antigifcentrum (tel. 070/245.245).

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten LIPACTIN® GEL te gebruiken

De vergeten dosis moet niet ingehaald worden.

Als u stopt met het gebruik van LIPACTIN® GEL

Niet van toepassing.

4. Mogelijke bijwerkingen.

Zoals alle geneesmiddelen kan LIPACTIN® GEL bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

- Soms kan na het aanbrengen van de gel tijdelijk een branderig gevoel op de behandelde plaats optreden.
- In zeldzame gevallen kunnen allergische reacties voorkomen.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u LIPACTIN® GEL?

LIPACTIN® GEL buiten het bereik en zicht van kinderen houden. Gebruik LIPACTIN® GEL niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de tube en buitenverpakking na "EXP". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand

6. Aanvullende informatie.

Wat bevat LIPACTIN® GEL

De werkzame bestanddelen zijn heparine-natrium en zinksulfaat.

Andere bestanddelen zijn glycerine 85 % - fenoxxyethanol - polysorbaat 60 - polysorbaat 80 - natriumcarboxymethylcellulose - gezuiverd water q.s. ad 1 g

Hoe ziet LIPACTIN® GEL er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Tube met 3 g gel.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vrij verkrijgbaar.

Registratiehouder: Louis Widmer NV - Haverheidelaan 9 - B-9140 Temse

Fabrikant: Laboratoria QUALIPHAR N.V./S.A. - Rijksweg 9 – B-2880 Bornem

Registratienummer: 276 S771 F7

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien op 25.09.2007.

De datum van de goedkeuring van deze bijsluiter is 10.2007.